

WUML 03/26/06,
Hepatitis B
ជម្ងឺថ្លើមប្រភេទ បេ

ជម្ងឺថ្លើមប្រភេទ បេ គឺកើតឡើងដោយការប៉ះពាល់ជាមួយ វីរុសថ្លើមប្រភេទ បេ។
ជម្ងឺថ្លើមប្រភេទ បេ គឺជាជម្ងឺមួយងាយឆ្លងបំផុត ដោយការប៉ះពាល់ជាមួយនឹងវីរុស
ថ្លើម A,B,C និង E ។

ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយជម្ងឺថ្លើមបណ្តាលមកពីបញ្ហាផ្សេងទៀតដូចជា:
ពិសារស្រាវរយៈពេលយូរ,មានការប៉ះពាល់ជាមួយជាតិគីមី និងការប្រើថ្នាំមួយចំនួន
ដែលធ្វើអោយខូចថ្លើម។

គ្រប់ប្រភេទនៃជម្ងឺថ្លើម A,B,C និង E គឺបណ្តាលអោយខូចសាច់ថ្លើម,ហើមថ្លើមនិង
រីងថ្លើម(Liver Inflammation) ឬអាចបណ្តាលអោយខូចថ្លើមរហូតតែម្តង។

ជម្ងឺថ្លើមប្រភេទ បេ អាចកើតឡើងក្នុងរយៈពេលខ្លី,កើតឡើងភ្លាម ឬរយៈពេលយូរ
រ៉ាំរ៉ៃ។

ការកើតឡើងភ្លាមជាធម្មតាជាសះស្បើយដោយខ្លួនឯងដោយមិនបាច់ព្យាបាល។ចំពោះ
មនុស្សមួយចំនួនមិនមានអាការៈអ្វីឡើយ។ ចំពោះមនុស្សមួយចំនួនទៀតដែលមាន
អាការៈរោគ ជម្ងឺនិងបានធ្វើស្រាវរយៈពេល ២ ទៅ ៣ សប្តាហ៍។ ប៉ុន្តែ អាការៈរោគ
និងកើតឡើងវិញបន្ទាប់ពី ៤ ទៅ ៨ សប្តាហ៍។ អ្នកដែរកើតជម្ងឺថ្លើមភ្លាមហើយបាត់ទៅ
វិញនោះ អ្នកនោះនិងមិនតើកជម្ងឺថ្លើមទៀតទេ ផងដែរក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកបានបង្កើត
អង្គបដិបក្ខការពារទប់ទល់នឹងជម្ងឺថ្លើមប្រភេទ បេ ដែរការពារជីវិតរបស់អ្នកទៅថ្ងៃ
អនាគត។ មនុស្សភាគច្រើនដែលមានជម្ងឺថ្លើមប្រភេទ បេកើតឡើងភ្លាម គឺមិនបណ្តាល
កើតជម្ងឺថ្លើមប្រភេទ បេ រ៉ាំរ៉ៃទេ។

ជម្ងឺថ្លើមរ៉ាំរ៉ៃគឺកើតឡើងនៅពេលដែរមេរោគវីរុសថ្លើមនៅតែបង្ហាញអោយឃើញនៅ
ក្នុងថ្លើម និង ថ្លើមរយៈពេល៦ខែ ឬ ច្រើនជាងនេះ។ ជម្ងឺរ៉ាំរ៉ៃគឺអាចបណ្តាលអោយ
មហារីកថ្លើម។ នៅពេលដែលអ្នកមានជម្ងឺថ្លើមប្រភេទ បេ រ៉ាំរ៉ៃអ្នកអាចចម្លង
មេរោគនេះទៅអ្នកផ្សេងយ៉ាងងាយស្រួល។

ក្នុងការប៉ាន់ប្រមាណមនុស្សប្រមាណ ១២៥ លាននាក់ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមាន

ជម្ងឺថ្លើមប្រភេទ បេ រ៉ាំរ៉ៃ។ នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកជម្ងឺថ្លើមប្រភេទ បេ កើតឡើងភ្លាម គឺភាគច្រើនកើតឡើងចំពោះក្មេងជំទង់ និង មនុស្សពេញវ័យ។

អាការៈនៃជម្ងឺថ្លើមប្រភេទ បេ មាន៖

- អស់កម្លាំងល្អិតល្អៃ
- គ្រុនក្តៅល្មម
- ឈឺក្បាល
- បរិភោគមិនបាន
- ចង្កោ និង ក្អួត
- កន្ទួលក្រហមលើស្បែក
- ឈឺសាច់ដុំ និង សន្តាក់
- រាគ ឬ ទល់លាមក
- ភ្នែក និងស្បែកឡើងលឿង

មនុស្សភាគច្រើនដែលរលាមជម្ងឺថ្លើមរ៉ាំរ៉ៃមិនមានអាការៈរោគអ្វីឡើយ។

ព័ត៌មាននេះដកស្រង់ ពី វេបសាយ បេស៍ Yahoo Health.