

រោគគ្រុនផ្តាសាយធំ
Influenza
WUML
11/26/06

រោគគ្រុនផ្តាសាយធំជាជំងឺឆ្លងមួយដែលបណ្តាលមកពីមេរោគវីរុស Influenza ឬ Influenza Virus។ រោគនេះអាចកើតពីឈឺចាប់ទៅជាឈឺធ្ងន់ ហើយជួនកាលអាចបណ្តាល ឲ្យស្លាប់បាន។ មធ្យោបាយតែមួយ ដែលប្រសើរបំផុត ក្នុងការការពាររោគនេះ គឺការចាក់ថ្នាំ បង្ការរោគ នៅរាល់ពេលរដូវស្លឹកឈើជ្រុះ។

នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក ក្នុងមួយឆ្នាំៗ មានប្រជាជនប្រហែលជាមធ្យម ពី 5% ទៅ 20% ធ្លាក់ខ្លួន ឈឺដោយសាររោគគ្រុនផ្តាសាយធំ។ ចំនួនជាង 20 ម៉ឺននាក់ បានត្រូវចូលសំណួរក្នុងមន្ទីរពេទ្យ ដោយសារជម្ងឺផ្សេងៗដែលបណ្តាលមកពីគ្រុនផ្តាសាយធំនេះ។ ហើយ 3 ម៉ឺន 6 ពាន់នាក់បាន ត្រូវស្លាប់។

អ្នកដែលអាចមានគ្រោះថ្នាក់ដោយសាររោគគ្រុនផ្តាសាយធំច្រើនជាងគេ គឺអស់លោកចាស់ៗ, ក្មេងតូចៗ និងអ្នកដែលមានជម្ងឺប្រចាំកាយផ្សេងៗ។

អាការៈរោគដែលគួរឲ្យកត់សំគាល់ មានដូចជា៖

- គ្រុនក្តៅ (ភាគច្រើនគឺក្តៅខ្លាំង)
- ឈឺក្បាល
- ទន់ខ្សោយ និងអស់កម្លាំងល្អិតល្អៃ
- ក្អកស្នូត
- ឈឺបំពង់ក
- ហៀសំបោរ ឬតឹងច្រមុះ
- ឈឺរមាត់រាងកាយ ឯ

ជម្ងឺដែលអាចបណ្តាលមកពីរោគគ្រុនផ្តាសាយធំមានដូចជា រោគហើមស្លឹតដោយសារ មេរោគ បាក់តេរី, ការអស់ជាតិទឹកក្នុងខ្លួន, និងការធ្វើឲ្យជម្ងឺប្រចាំកាយកាន់តែមានលក្ខណៈ ដុះដាច់ ថែមទៀត។ ជម្ងឺទាំងនេះ មានដូចជា៖ ជម្ងឺបេះដូង, ជម្ងឺហើត, ឬជម្ងឺទឹកនោមផ្អែមជាដើម។ ម្យ៉ាងទៀត ក្មេងៗអាចធ្វើឲ្យកើតជម្ងឺ sinus និងឈឺត្រចៀក។

រោគគ្រុនផ្តាសាយធំឆ្លងពីមនុស្សម្នាក់ទៅមនុស្សម្នាក់ទៀតដោយសារការក្អកក្អមឬកណ្តាល។ ភាគច្រើន គឺដោយសារការប៉ះមនុស្សម្នាក់ទៀតដែលមានមេរោគវីរុស ហើយយកដៃទៅប៉ះច្រមុះ ឬមាត់ខ្លួនឯង។ មនុស្សពេលវ័យអាចចម្លងមេរោគទៅមនុស្សម្នាក់ទៀត ក្នុងរយៈពេលមួយថ្ងៃ មុនពេលដែលខ្លួនចាប់ផ្តើមឈឺ និងក្នុងរយៈពេល 7 ថ្ងៃបន្ទាប់ពីធ្លាក់ខ្លួនឈឺ។ នេះគឺបានន័យថា លោកអ្នកអាចចម្លងមេរោគទៅអ្នកដទៃបាន ទាំងមុនពេលដែលលោកអ្នកដឹងថាខ្លួនកើតរោគគ្រុនផ្តាសាយធំនិងពេលកំពុងឈឺ។

ប្រសិនបើ លោកអ្នកដឹងថា ខ្លួនកើតរោគគ្រុនផ្តាសាយធំ លោកអ្នកគួរ៖

- សំរាន្តនៅលើគ្រែ
- ទទួលទានទឹកឲ្យបានច្រើន
- លេបថ្នាំដែលពុំមានជាតិអាស៊ីរីន ដូចជា Tylenol, Advil, ឬ Motrin។
- គួរដោះផ្ទះកុំអញ្ជើញទៅកន្លែងសាធារណៈផ្សេងៗ រហូតដល់អាការៈរោគនេះបានធូរស្បើយ ភាគច្រើនពី 5-7 ថ្ងៃ។
- ពិគ្រោះជាមួយគ្រូពេទ្យរបស់លោកអ្នក បើសិនជាចង់ប្រើថ្នាំផ្សេងៗ ពីព្រោះថ្នាំខ្លះអាចធ្វើមានផលវិបាកបាន។

លោកអ្នកគួរអញ្ជើញទៅឲ្យគ្រូពេទ្យពិនិត្យមើល ឬអញ្ជើញទៅមន្ទីរព្យាបាលជាអាសន្នភ្លាម បើសិនជាលោកអ្នកមានអាការៈ ដូចជា៖

- ឈឺខ្លាំង ដុះដាប ហើយមានរយៈពេលយូរ
- ដកដង្ហើមពិបាក ឬញាប់, ឬមានជាំស្បែក
- ដកដង្ហើមមកឈឺ
- ធ្លាក់ខ្លួនគ្រុនក្តៅ, ឈឺ, ឬក្អកម្តងទៀត បន្ទាប់ពីជាគ្រុនផ្តាសាយធំហើយ
- ក្អកមានធ្លាក់កំហាក ឬស្ទះពីលើដៃ

រយៈពេលដែលគួរចាក់ថ្នាំបង្ការរោគគ្រុនផ្តាសាយធំល្អជាងគេ គឺក្នុងរយៈពេលពីខែ តុលា (ខែ10) និងខែវិច្ឆិកា (ខែ11)។ ប៉ុន្តែលោកអ្នកក៏នៅអាចចាក់បានរហូតដល់ខែធ្នូ ឬយឺតជាងនេះក៏បាន ។ រដូវគ្រុនផ្តាសាយធំ អាចចាប់ផ្តើមពីខែតុលា (ខែ10) ហើយមានរហូតដល់ ខែឧសភា (ខែ5)។

ចំពោះព័ត៌មានបន្ថែម ស្តីអំពីស្ថានភាពនៃថ្នាំបង្ការរោគគ្រុនផ្តាសាយធំ ឬវិធីផ្សេងៗសំរាប់ការពាររោគនេះ សូមមេត្តាអាន វិបសែរបស់ក្រសួងសាធារណៈសុខាភិបាលនៃរដ្ឋម៉ាសាឈូសេត