

រោគរលាកថ្លើមប្រភេទ C (Hepatitis C)

រោគរលាកថ្លើមប្រភេទ C អាចបណ្តាលមកពីមេរោគវីរុស ដែលជាមេរោគបណ្តាលអោយមានជម្ងឺថ្លើម។ មេរោគវីរុសដែលបណ្តាលឲ្យកើតរោគរលាកថ្លើមប្រភេទ C ច្រើនមាននៅក្នុងឈាម និងថ្លើមរបស់មនុស្សដែលមានរោគរលាកថ្លើមប្រភេទ C ។

ភាគច្រើន មេរោគវីរុសឆ្លងដោយសារឈាម។ មនុស្សដែលអាចឆ្លងរោគនេះបាន គឺច្រើនជាអ្នកដែលទទួលការបញ្ចូលឈាម ឬការប្តូរគ្រឿងក្នុងពីមុនឆ្នាំ១៩៧២ ឬអ្នកដែលប្រើមូលចាក់ថ្នាំរួមគ្នា (ឧទាហរណ៍ ដូចជាអ្នកប្រើមូលចាក់បញ្ចូលគ្រឿងព្យាបាលជាដើម)។ ចាប់តាំងពីខែកក្កដា ឆ្នាំ ១៩៧២ មក ឈាមដែលត្រូវបញ្ចូលឲ្យអ្នកជម្ងឺ បានត្រូវពិនិត្យមើលយ៉ាងច្បាស់លាស់ ដើម្បីកុំឲ្យមានមេរោគវីរុសនេះ ហើយបានត្រូវចាត់ទុកថា ពុំមានគ្រោះថ្នាក់អ្វីឡើយ។

មេរោគវីរុសរលាកថ្លើមប្រភេទ C អាចឆ្លងនៅពេលណាដែលមានឈាម ឬវត្ថុរាវមានឈាម ឬនិងស្បែកដែលមុត ឬរលាត់។ ការឆ្លងនេះអាចកើតឡើងបាន ទោះបីជាស្បែកដែលមុតនោះ មានទំហំតូច មើលពុំឃើញក៏ដោយ។ មេរោគនេះក៏អាចឆ្លងដោយសារការរួមភេទបានដែរ, ប៉ុន្តែ ការឆ្លងរបៀបនេះ មិនអាចកើតឡើងបានងាយៗ ដូចជា មេរោគអេចអាយវី ដែលបង្កើតជម្ងឺអេដស៍ នោះឡើយ។

មេរោគវីរុសរលាកថ្លើមប្រភេទ C មិនអាចឆ្លងបានដោយសារ ការអោបរិត, កន្ត្រាស់, ក្អក, ឬការទទួលទានអាហាររួមគ្នានោះឡើយ។ ហើយ លោកអ្នកក៏មិនអាចឆ្លងមេរោគនេះ ដោយសារការផ្តល់ឈាមនោះដែរ។

រោគរលាកថ្លើមប្រភេទ C អាចជារោគមួយដែលធ្ងន់ធ្ងរជាទីបំផុត។ មនុស្សភាគច្រើន ដែលកើតរោគនេះ អាចមានផ្ទុកមេរោគនេះ អស់មួយជីវិត។ មនុស្សមួយចំនួនដែលមានរោគរលាកថ្លើមប្រភេទ C អាចធ្វើឲ្យខូចថ្លើមហើយ ធ្លាក់ខ្លួនឈឺជាទម្ងន់។ អ្នកខ្លះទៀត ប្រហែលជានៅមានសុខភាពរឹងមាំ បន្ទាប់ពីមានរោគរលាកថ្លើមប្រភេទនេះ។ ជាទីបំផុត មេរោគរលាកថ្លើមប្រភេទ C អាចបណ្តាល អោយអ្នកជម្ងឺ កើតជម្ងឺក្រិនថ្លើម ឬមហារីកថ្លើម។ នៅពេលដែលមនុស្សភាគច្រើន ពុំមានជម្ងឺខូច ថ្លើម ឬជម្ងឺមហារីកថ្លើម យើងពុំអាចដឹងច្បាស់ថា តើនរណាម្នាក់នឹងមានរោគនេះ ឬពុំមានឡើយ។

អ្នកដែលអាចកើតរោគរលាកថ្លើមប្រភេទ C បាន គឺអ្នកដែល៖

- ប្រើគ្រឿងញៀន ឬប្រើម្ហូបម្ហូបម្ហូប ទោះបីជាប្រើតែមួយដងក៏ដោយ។
- បានទទួលការបញ្ចូលឈាម, អ្វីដែលធ្វើពីឈាម, ឬប្តូរគ្រឿងក្នុងថ្នាំ មុនខែកក្កដា ឆ្នាំ១៩៧២។
- បានរួមភេទជាមួយគូរដៃច្រើន, ជាពិសេស ប្រសិនបើអ្នកនោះពុំមានប្រើស្រោមអនាម័យសំរាប់ការពារ។
- ធ្វើការផ្ទេកសុខាភិបាល ដូចជា វេជ្ជបណ្ឌិត ឬគ្រូពេទ្យជាដើម គឺអ្នកដែលអាចប៉ះពាល់ឈាម ឬម្ហូបចាក់ថ្នាំ។
- ទារកដែលកើតពីម្តាយដែលមានរោគរលាកថ្លើមប្រភេទ C។
- ធ្លាប់ទទួលការលាងឈាម។

ជួនកាល ថ្នាំម្យ៉ាងហៅថា interferon អាចប្រើសំរាប់ព្យាបាលរោគរលាកថ្លើមប្រភេទ C បាន។ ភាគច្រើនថ្នាំនេះ ប្រើរួមគ្នាជាមួយថ្នាំផ្សេងទៀតបាន ដូចជាថ្នាំ Ribavirin។ អ្នកមាន រោគរលាកថ្លើមប្រភេទ C ពុំគួរទទួលទានសុរា ឬលេបថ្នាំប្រភេទណាមួយដែលអាចធ្វើអោយខូចថ្លើមឡើយ។ អ្នកដែលមានរោគរលាកថ្លើមប្រភេទ C គួរទទួលបានថ្នាំការពាររោគរលាកថ្លើមប្រភេទ A&B, ដែលជាមេរោគវីរុសពីរប្រភេទទៀត ធ្វើអោយខូចថ្លើមដែរ។ ថ្នាំផ្សះ អង់ទីប្យូទិក (Antibiotics) ក៏ពុំអាចមានលទ្ធភាពប្រឆាំងបំបាត់ជាមួយមេរោគវីរុសរលាកថ្លើមប្រភេទ C បានឡើយ។ សូមមេត្តាពិភាក្សាជាមួយគ្រូពេទ្យរបស់លោកអ្នក អំពីវិធីព្យាបាលផ្សេងៗដែលអាចដែលមាន និងវិធីផ្សេងៗទៀត ដែលលោកអ្នកអាចអនុវត្តដើម្បីការពារកុំឲ្យខូចថ្លើមបាន។

ក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះ ពុំមានថ្នាំអ្វីសំរាប់ចាក់ការពាររោគរលាកថ្លើមប្រភេទ C ឡើយ។ មធ្យោបាយប្រសើរបំផុតក្នុងការការពារកុំឲ្យកើតរោគនេះ គឺការជៀសវាងកុំឲ្យមានប៉ះពាល់ឈាម។ នេះគឺបានន័យថា កុំប្រើម្ហូបចាក់ថ្នាំ, ប្រដាប់កោរពុកមាត់ ឬប្រាស់ដុំសឆ្មេញរួមគ្នា។ មន្ទីរទទួលអំណោយឈាម ឥឡូវនេះបានធ្វើការពិនិត្យឈាមកុំឲ្យមានមេរោគរលាកថ្លើមប្រភេទ C យ៉ាងដិតដល់។ ដូច្នេះការអាចឆ្លងរោគតាមការបញ្ចូលឈាមថ្មី គឺមានតិចតួចស្តួចស្តើងណាស់។ លោកអ្នកអាចឆ្លងមេរោគរលាកថ្លើមប្រភេទ C តាមការរួមភេទ ការប្រើស្រោមអនាម័យអាចជួយបន្ថយកុំឲ្យមានឆ្លងរោគនេះបាន។

- សូមកុំប្រើម្ហូបម្ហូបម្ហូប ប្រសិនបើចាក់គ្រឿងញៀន។ កុំប្រើបំពង់ហ្វឹតថ្នាំញៀនកូរ៉េនរួមគ្នា ពីព្រោះវាអាចមានជាប់ឈាមមកជាមួយ។ គួរស្រាវជ្រាវរកកម្មវិធីដែលអាចជួយកុំឲ្យអ្នកប្រើគ្រឿងញៀន។
- ប្រើស្រោមអនាម័យរាល់ពេលរួមភេទ។

- ប្រសិនបើចង់ធ្លាក់ តាតូ (Tattoos) ឬចោះក្រវិល សូមធ្លាក់ឬចោះតែនៅកន្លែងណាដែលមានច្បាប់អនុញ្ញាតិ និងមានប្រើប្រដាប់លាងត្រឹមត្រូវ។
- ចំពោះបុគ្គលិកធ្វើការក្នុងមន្ទីរពេទ្យឬលាងសំអាតមន្ទីរពេទ្យ គួរប្រើអនុវត្តវិធីលាងសំអាតទៅតាមក្បួនត្រឹមត្រូវ។
- ប្រសិនបើ អ្នកកើតរោគរលាកថ្លើមប្រភេទ C សូមកុំប្រើប្រដាប់កោរពុកមាត់ ឬប្រាស់ដុសធ្មេញរួមគ្នាជាមួយអ្នកដទៃ។
- ប្រសិនបើ អ្នកកើតរោគរលាកថ្លើមប្រភេទ C៖ សូមកុំផ្តល់អំណោយឈាម, មេជីវិត, ឬគ្រឿងក្នុង។

មានមេរោគវីរុសជាច្រើនដែលបណ្តាលឲ្យកើតរោគរលាកថ្លើម។ ប្រសិនបើលោកអ្នកមានរោគរលាកថ្លើមដៃតមួយប្រភេទ លោកអ្នកនៅតែអាចកើតរោគនេះប្រភេទផ្សេងៗទៀតបានដែរ។

រោគរលាកថ្លើមប្រភេទ A អាចឆ្លងតាមលាមកពីអ្នកដែលលោកអ្នកប៉ះពាល់, អាហារនិងទឹកដែលមានមេរោគ។ សូម្បីដែលលាមកតូចមួយក៏ដោយ ក៏វាអាចមានជាប់មេរោគបានដែរ។ មានថ្នាំបាក់សំរាប់ការពាររោគរលាកថ្លើមប្រភេទ A។ មេរោគវីរុសរលាកថ្លើមប្រភេទ B ឆ្លងតាមឈាមនិងវត្ថុរាវក្នុងរាងកាយ ដូចជាទឹកកាម។ រោគរលាកថ្លើមប្រភេទ B ក៏មានថ្នាំសំរាប់បាក់ការពារបានដែរ។ ប្រសិនបើលោកអ្នកមានរោគរលាកថ្លើមប្រភេទ C៖ សូមមេត្តាសាកសួរគ្រូពេទ្យរបស់លោកអ្នកដើម្បីឲ្យគាត់បាក់ថ្នាំការពាររោគរលាកថ្លើមប្រភេទ A និងប្រភេទ B ជួនលោកអ្នក។ ម្យ៉ាងទៀតការធ្វើតេស្តឈាមក៏អាចជួយឲ្យលោកអ្នកដឹងថាតើ លោកអ្នកមានរោគរលាកថ្លើមប្រភេទ C ឬពុំមានបានដែរ។

ចំពោះព័ត៌មានបន្ថែម លោកអ្នកអាច៖

- សាកសួរវេជ្ជបណ្ឌិតឬគ្រូពេទ្យរបស់លោកអ្នក
- ក្រសួងសុខាភិបាលប្រចាំតំបន់លោកអ្នក
- ក្រសួងសាធារណៈសុខាភិបាលនៃរដ្ឋម៉ាសាឈូសេត ផ្នែកជម្ងឺឆ្លងនិងការបាក់ថ្នាំបង្ការរោគទូរស័ព្ទលេខ (617) 983-6800 ឬ ទូរស័ព្ទដោយពុំចេញថ្លៃ លេខ (888) 658-2850 ឬអាទិភាពសេវាសង្គម <http://www.mass.gov/dph> ។

ព័ត៌មាននេះដឹកស្រង់និងបកប្រែចេញពីព័ត៌មាននៃក្រសួងសាធារណៈសុខាភិបាលប្រចាំ រដ្ឋម៉ាសាឈូសេត ដោយមណ្ឌលមេត្តាសុខភាពនៃមណ្ឌលសុខភាពសហគមន៍ក្រុងឡូរ៉ែល។

