

ក្រពេញនោមនិងជម្ងឺមហារីកក្រពេញ The Prostate and Prostate Cancer

Prostate គឺជាក្រពេញនោមដែលមានទំហំប្រហែលគ្រាប់ walnut ហើយដែលមានតែចំពោះ រាងកាយបុរស។ វាជាប្រដាប់បន្តពូជរបស់បុរសដែលបញ្ចេញវត្ថុរាវដើម្បីដឹកនាំមេជីវិត។ Prostate មាននៅពីមុខផ្លូវលាមក, ចំពីក្រោមផ្នែកនោម រុំ ស្រោបជុំវិញបំពង់នោម។ នៅពេល ដែល បុរសកាន់តែមានអាយុច្រើនឡើង Prostate ក៏ ភាគច្រើនកាន់តែមានទំហំធំឡើងដែរ។ លក្ខណៈ នេះ អាចបណ្តាលឲ្យ Prostate កៀបកង្កត់លើបំពង់នោម ហើយធ្វើឲ្យបុរសបន្ទោរបង់ ពុំសូវ ចេញច្រើន ដូចធម្មតា កាលពីខ្លួននៅក្មេង។

ឯ Prostate Cancer គឺជាការផ្តុំនៃកោសិកា ដែលរីកធំខុសប្លែកពីធម្មតា។ កោសិកានេះបាន បំបែកខ្លួនជាច្រើន ហើយបង្កើតជាកោសិកាថ្មីៗ ថែមទៀត ដែលរាងកាយពុំត្រូវការ ហើយ បង្កើតជាដុំ ហៅថា Tumor ។ ដុំដែលមានលក្ខណៈខុសពីប្រក្រតិនេះ ជួនកាលរីក, រាតត្បាត ទៅកន្លែងដទៃទៀត ហើយចេះតែរីកធំឡើងៗ ជាលំដាប់ រហូតដល់បណ្តាលឲ្យមនុស្សស្លាប់ បាត់បង់ជីវិតក៏មាន។

មកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះ អ្នកជំនាញការខាងវិជ្ជាពេទ្យ នៅតែពុំទាន់ដឹងឲ្យបានច្បាស់លាស់ អំពីមូលហេតុដែលបណ្តាលឲ្យកើតជម្ងឺមហារីក Prostate នេះនៅឡើយទេ ហើយគេក៏នៅតែ ពុំទាន់ដឹងច្បាស់អំពី វិធីការពារកុំឲ្យកើតជម្ងឺមហារីក Prostate នេះ នៅឡើយដែរ។ អ្នកជំនាញ ការទាំងនោះ កំពុងតែស្រាវជ្រាវជាបន្តទៅទៀត ដើម្បីរកមធ្យោបាយផ្សេងៗ ដែលអាចជួយ ការពារបុរសឲ្យជៀសវាងកើតជម្ងឺប្រភេទនេះបាន។ ប៉ុន្តែ គេបានដឹងថា ការកុំទទួលទានបារី, ការទទួលទានអាហារដែលមានជីវជាតិគ្រប់គ្រាន់, ការហាត់ប្រាណ, និងការអញ្ជើញទៅពិនិត្យ សុខភាពឲ្យទៀតទាត់ អាចជាកត្តាមួយអាចជួយឲ្យមានសុខភាពល្អបរិបូណ៌បាន។

ជាទូទៅ មានបុរសចំនួន 16% ដែលអាចកើតជម្ងឺមហារីក prostate ក្នុងចំណោមបុរសទាំង អស់ គឺ 1 នាក់ ក្នុងចំណោម 6 នាក់។ ក្នុងចំណោមនេះ មានចំនួន 3% អាចស្លាប់ដោយសារ ជម្ងឺនេះបាន គឺ 1 នាក់ក្នុងចំណោមបុរសចំនួន 33 នាក់។ នៅពេលដែលបុរសកាន់ តែមានវ័យ ចំណាស់ទៅ ការអាចមានជម្ងឺនេះក៏កាន់តែមានច្រើនឡើងដែរ។ កត្តា ដែលអាចបណ្តាលឲ្យ បុរសកើតជម្ងឺមហារីក Prostate គឺ មានទាក់ទងទៅ នឹង៖

- ពូជ-បុរសដែលមានឪពុកឬបងប្អូនប្រុសកើតជម្ងឺមហារីក Prostate។
- ម្យ៉ាងទៀត ជម្ងឺនេះអាចមានទាក់ទងទៅនឹងពូជសាសន៍ ផងដែរ គឺវាអាចមានកើត នៅ ចំពោះជនជាតិសាសន៍មួយជំពូក ជាងសាសន៍មួយជំពូកទៀត។ គេនៅពុំទាន់ដឹងច្បាស់

អំពីមូលហេតុនេះនៅឡើយទេ តែគេដឹងថា ជម្ងឺមហារីក Prostate ច្រើនមាន នៅចំពោះជន ជាតិអាហ្វ្រិក-អាមេរិកាំង ច្រើនជាង ជនជាតិស្បែកស ហើយពុំសូវមានប៉ុន្មាន ក្នុង ចំណោមជនជាតិស្បែកស, អាស៊ី, ជនជាតិនៅតាមកោះប៉ាស៊ីហ្វិក, និងជនជាតិអាមេរិកាំង- ឥណ្ឌូន ដូចជាមានចំពោះជនជាតិស្បែកសដែរ។

ជម្ងឺមហារីក Prostate ខ្លះ អាចរាតត្បាតយ៉ាងឆាប់រហ័ស ហើយរាលទៅកន្លែងដទៃទៀត នៃ រាងកាយរហូតដល់បណ្តាលឲ្យមនុស្សនោះស្លាប់បាត់បង់ជីវិតបាន។ ប៉ុន្តែ ជម្ងឺមហារីក ខ្លះទៀត មានកម្លាំងខ្សោយ ហើយពុំធ្វើឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិត ប៉ុន្មានទេ។ វេជ្ជបណ្ឌិត ពុំអាចសន្មត់ ឲ្យបានច្បាស់លាស់ថា តើជម្ងឺមហារីកប្រភេទណាមួយ ដែលលោកអ្នកមាននោះឡើយ។

ក្នុងចំណោមជម្ងឺមហារីកទាំងអស់ដែលធ្វើឲ្យបុរសស្លាប់ ជម្ងឺមហារីក Prostate ជាជម្ងឺទីពីរ ដែលធ្វើឲ្យបុរសស្លាប់ បន្ទាប់ពីជម្ងឺមហារីកសួត។ ប្រសិនបើ ប្រៀបធៀបទៅនឹងជម្ងឺដទៃទៀត ដែលបណ្តាលឲ្យបុរសស្លាប់ 45 ឆ្នាំស្ទើរ ជម្ងឺមហារីក Prostate រាប់ជាជម្ងឺ ទី 5 ។

អាការៈរោគនៃជម្ងឺមហារីក Prostate មានដូចជា៖

- មានឈាមនៅក្នុងទឹកនោម
- ឈឺបត់ជើងតូចច្រើន ជាពិសេសនៅពេលយប់
- បត់ជើងតូចរអាក់រអួលៗ ហើយមានកម្លាំងខ្សោយ
- មានការឈឺចាប់ ឬក្រហាយនៅពេលបត់ជើងតូចម្តងៗ
- ពុំអាចបត់ជើងតូចបានទាល់តែសោះ ឬ
- ចេះតែឈឺចង្កេះ, ឈឺត្រគាត, ឬឈឺភ្នៅ

ប្រសិនបើ លោកអ្នកមានអាការៈរោគ ដូចដែលខ្ញុំបាន បានជំរាបមកអប្បបរមា នេះ សូមអញ្ជើញ ទៅឲ្យគ្រូពេទ្យពិនិត្យមើលជាបន្ទាន់។ សូមមេត្តាជ្រាបថា អាការៈទាំងនេះក៏អាចបណ្តាលមក បញ្ហាក្រពេញឬ បញ្ហា Prostate ដែល ពុំមែនទាក់ទងទៅនឹងជម្ងឺមហារីកបានដែរ។

នៅពេលដែលគ្រូពេទ្យរកឃើញថា មានជម្ងឺមហារីក Prostate ទាន់ មុនពេល ដែលវារាលដាល គ្រូពេទ្យអាច៖

- គ្រាន់តែចាំមើល ដោយធ្វើតេស្ត ឬព្យាបាលអាការៈផ្សេងៗ ដែលបណ្តាលមកពីជម្ងឺនេះ
- ធ្វើការវះកាត់យកក្រពេញចេញ
- ព្យាបាលពីក្រៅ ដោយប្រើ Radiation ដើម្បីរំលាយកោសិកាដែលមានជាតិមហារីក
- ព្យាបាលខាងក្នុងដោយប្រើ Radiation ដើម្បីរំលាយ កោសិកាដែលមានកើតជម្ងឺមហារីក

- ព្យាបាលដោយប្រើជាតិអ័រម៉ូន ដើម្បីទប់កោសិកាដែលនាំ ឲ្យកើតជម្ងឺមហារីកកុំឲ្យរីកធំ តទៅ ទៀត
- វិធីព្យាបាល Cryotherapy ដោយដាក់ប្រដាប់នៅជិត Prostate ដែលមានជម្ងឺមហារីក ដើម្បីឲ្យវាកកហើយរំលាយ កោសិកាដែលមានកើតជម្ងឺមហារីកនោះចេញ។

ប្រសិនបើ ជម្ងឺមហារីកកើតដល់ដំណាក់កាលធ្ងន់ធ្ងរ ហើយមានរាលដាលទៅកន្លែងផ្សេងៗទៀតដែល ជាហេតុនាំឲ្យពិបាកព្យាបាល អ្នកជម្ងឺគួរពិភាក្សាជាមួយគ្រូពេទ្យ ដើម្បីជ្រើសរើសរកមធ្យោបាយ ដទៃទៀតមកអនុវត្ត។

ផលវិបាកនៃការព្យាបាល គឺអាស្រ័យទៅលើប្រភេទនៃវិធីព្យាបាលនីមួយៗ, អាយុរបស់អ្នកជម្ងឺ, និងសុខភាពទូទៅរបស់អ្នកជម្ងឺ។ អ្នកជម្ងឺអាចមានការឈឺចាប់, ពុំស្រួលខ្លួន, និងអាចមានផល វិបាកដទៃទៀត ដែលអាចបាត់ទៅវិញយ៉ាងឆាប់រហ័ស ឬក៏យូរអង្វែង។ ផលវិបាកពីរ យ៉ាង ដែលអាចបណ្តាលមកពីការព្យាបាលគឺ ការពុំអាចរួមដំណេកទៅអនាគតបាន ពាក្យអង់ គ្លេស ហៅថា (Impotent) និងការពុំអាចទប់ទឹកនោមជាប់ (Urine Incontinence)។ ជាការមួយ សំខាន់ នៅពេលដែលគ្រូពេទ្យពន្យល់អំពីវិធីព្យាបាលផ្សេងៗ អ្នកជម្ងឺគួរពិគ្រោះជាមួយគ្រូពេទ្យ នោះ នូវផលវិបាកដែលអាចបណ្តាលមកពីវិធីព្យាបាលនីមួយៗនោះផងដែរ។ ម្យ៉ាងទៀតគ្រូពេទ្យ អាចបញ្ជាក់ឲ្យទិញថ្នាំខ្លះ លេបសំរាប់ជួយសំរាលផលវិបាកទាំងនោះបានផងដែរ។

សរុបសេចក្តីទៅ ការជ្រើសរើសធ្វើតេស្តដើម្បីរកមើលជម្ងឺមហារីក Prostate ជាសិទ្ធិរបស់ លោកអ្នកផ្ទាល់ ដូច្នោះគួរពិភាក្សាជាមួយគ្រូពេទ្យនិងគ្រូសាររបស់លោកអ្នកឲ្យបានច្បាស់ លាស់។

ចំពោះព័ត៌មានបន្ថែមស្តីអំពីការធ្វើតេស្តផ្សេងៗនិងការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកក្រពេញ សូម ទូរស័ព្ទទៅលេខ 1-800-4-CANCER (1-800-422-6237) ឬអាទិភ័យសេ www.healthfinder.gov ។ ឬ American Cancer Society, www.cancer.org ។

ព័ត៌មាននេះដាក់ស្រង់និងបកប្រែចេញពីមជ្ឈមណ្ឌលការពារនិងបង្ក្រាបជម្ងឺ ផ្សេងៗនៃក្រសួងសុខាភិបាល និងមនុស្សធម៌ នៃ សហរដ្ឋអាមេរិក Center for Disease Control and Prevention, U.S. Department of Health and Human Services, ដោយមណ្ឌលមេត្តាសុខភាពនៃមណ្ឌលសុខាភិបាលសហគមន៍ ក្រុងឡូវើល អស័យដ្ឋានលេខ 135 Jackson St., Lowell, MA 018952។